


# SOP – Generalisierter Krampfanfall des Kindes



# SOP – Generalisierter Krampfanfall des Kindes

## ABCDE-Schema nach VA Evaluation

Möglichst genaue Fremdanamnese über Verlauf des Anfalles und Ereignisse vor dem Anfall erheben:  
Infekt?, Fieber?, frühere Krampfanfälle?, Krampfanfälle bei Geschwisterkindern?

## Verdachtsdiagnose

Tonisch-klonische Krämpfe, Bewusstseinsstörung, Zungenbiss, Speichelfluss, Einnässen, Einkoten, unregelmäßige Atmung, kurzzeitige Apnoe, Zyanose  
Postiktaler Zustand (nach dem Krampfanfall): Pat. verwirrt, desorientiert, evtl. aggressiv, evtl. Bewusstseinsstörung, evtl. Todd'sche Lähmung

## Differentialdiagnose

Meningitis, Encephalitis

## Notarzt nachalarmieren

Gemäß Notarztindikationskatalog RLP

## Basismaßnahmen

Patient vor Verletzungen schützen, kein Beißkeil, Seitenlage bei Bewusstlosigkeit

## Erweiterte Basismaßnahmen

Sauerstoffgabe, Fiebersenkung ab 38,5°C Körpertemperatur, bei Hypoglykämie: Glukosegabe nach SOP Hypoglykämie

## Aufklärung / Einwilligung

Gemäß des geäußerten oder mutmaßlichen Patientenwillens  
Dokumentation im Einsatzprotokoll notwendig

i.v. Zugang wenn möglich, davor alternative Zugangswege nutzen

Monitoring wenn möglich, SpO<sub>2</sub> Messung anstreben

## Kontraindikation

Krampfanfall beendet, postiktaler Zustand  
Intoxikation mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten  
Myasthenia Gravis  
Allergie oder Überempfindlichkeit gegen Diazepam

## Medikamente

Die Applikation erfolgt rektal mittels Rectiole. Darauf achten, dass das Medikament nicht ausläuft.

## Verlaufskontrolle

Der Status epilepticus (Dauer des Krampfanfalls > 5 Minuten oder wiederkehrende Krampfanfälle) ist ein lebensbedrohlicher Notfall und erfordert eine schnellstmögliche notfallmedizinische Behandlung

Transport nach VA Rettungseinsatz

## Zielklinik

Abhängig von der Vorgeschichte ggf. vorbehandelnde Klinik

Dokumentation/DIVI-Protokoll

# Checkliste – Generalisierter Krampfanfall des Kindes

## Diazepam Rektaltube:

5-10kgKG 5mg

>15kgKG 10mg

## Kontraindikationen

- Krampfanfall beendet, postiktaler Zustand
- Alter < 6 Monate oder Körpergewicht < 5 kg
- Intoxikation mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten
- Myasthenia Gravis
- Allergie oder Überempfindlichkeit gegen Diazepam

## Verlaufskontrolle

Der Status epilepticus (Dauer des Krampfanfalls > 5 Minuten) ist ein lebensbedrohlicher Notfall und erfordert eine schnellstmögliche notfallmedizinische Behandlung